

ما چه سازمانی هستیم؟

هدف ما

هدف ما مبارزه با انتقال و شیوع باکتریهای مقاوم مولتی رزیستان است.

همکاران ما

- Westküstenkliniken gGmbH (Heide und Brunsbüttel)
- Kreis Dithmarschen
- St. Georg gGmbH
- St. Johannis gGmbH
- Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
- Pflegeservice Albersdorf
- Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller & Tiessen
- Seniorenresidenz Dethlefsen
- Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
- Haus Uthaven GmbH
- Pflegezentrum Marsch und Geest
- DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-Detlefs-Haus“
- DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöfte“
- DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
- DRK KV-Dithmarschen
- Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
- Pflegeheim Kohlsaar
- Reha-Haus-Buchholz GmbH
- Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
- DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH

www.dithmarschen.sh-mre.de

MRE-Netzwerk Dithmarschen
Esmarchstr. 50, 25746 Heide
Tel. 0481 785 49 00

باکتریهای مقاوم مولتی رزیستان

چه اطلاعاتی را مایلم بدانم؟

Stempel der Einrichtung

Auflage: 05.2016 | FA



کلوسترویدیوم دیفیسیل اسوسیرته دیارو CDAD



اطلاعاتی برای
نزدیکان و خویشاوندان ساکنین
و بیماران/مراجعین

دچار به عفونتهای باکتریهای مقاوم
در کلینیکهای مراقبتی دارای تخت و کلینیکهای درمانی بدون تخت

MRE-Netzwerk Dithmarschen
باکتریهای مقاوم مولتی رزیستان

CDAD - در کجا، چگونه باید عمل کرد؟

در بیمارستان

در این مکان باید مقررات خاصی برای مقابله با شیوع و پیشرفت این بیماری واگیردار انجام گیرد. برای کسب اطلاع لطفاً به پرسنل پرستاران مراجعه کنید. هنگام بروز مرحله اسهال از نوع حاد باید اقدامات لازم جهت قرنطینه به عمل آید. قرنطینه هنگامی به پایان میرسد که ۷۲ ساعت از آخرین بروز اسهال گذشته باشد.

در خانه سالمندان و مکانهای مراقبتهای ویژه

همچنین در این مکانها اقدامات لازم جهت انجام قرنطینه ضروری است. قرنطینه هنگامی به پایان میرسد که ۷۲ ساعت از آخرین بروز اسهال گذشته باشد.

ملاقات کنندگان باید ورود خود را به اتاق شخص مبتلا از قبل به مسئولین پرستار اطلاع دهند، خود را معرفی کنند و اطلاعات لازم را در مورد حفاظت خود کسب کنند.

در مکانهای مسکونی

در مرحله بروز اسهال و ۳ روز پس از آن شخص بیمار نباید در اجتماعات شرکت کند (مثلاً نوشیدن قهوه در جمع).

مسئولین مراقبتهای ویژه، گروههای نجات و حمل بیمار و همچنین پزشکان اقدامات لازم را جهت مبارزه با انتقال این بیماری به عمل میآورند. در صورت دچار شدن به این بیماری با پزشک خود حتماً صحبت کنید.

CDAD - چگونه باید عمل کرد؟

در درجه اول - نظافت دستها

شستن کامل دستها اهمیت خاص و بسیاری دارد. پیشنهاد میشود که دستهای خود را ضد عفونی نمایید.

چنانچه شخص مبتلا به علت مشکلات ذهنی و یا جسمانی نتواند نظافت دستهای خود را به تنهایی انجام دهد باید به او در انجام این کار کمک شود.

رختها و لباسها باید فوراً پس از استفاده با حرارت ۶۰ درجه شسته شوند.

قاشق چنگال و کارد و ظروف باید در ماشین ظرفشویی با حرارت حد اقل ۶۵ درجه شسته شوند.

وسایل و اشیائی که شخص مبتلا با آن کار کرده و یا از آن استفاده نموده است باید پس از استفاده ضد عفونی شوند.

بخصوص دستشویی و توالت و اشیاء مربوط به آن.

وسایل و ابزار بهداشتی که با ادرار و یا مدفوع شخص مبتلا در ارتباط مستقیم قرار گرفته باید مرتباً روزانه به مکان نابود سازی زباله ها حمل شوند.

CDAD - چیست؟

C - Clostridium کلوسترودیوم
D - difficile دیفیسیل
A - assoziierte اسوسیرته
D - Diarrhoe دیارو

کلوسترودیوم دیفیسیل اسوسیرته دیارو که مخفف آن CDAD نام دارد، نام یک نوع عارضه و بیماری عفونی است که هنگام استفاده و مداوا با آنتی بیوتیک بروز میکند.

علائم آن در ساکنین و یا مراجعینی که به آن مبتلا شده اند معمولاً بین ۳ تا ۱۰ روز پس از شروع مصرف آنتی بیوتیک دیده میشود.

این بیماری حاد عفونی میتواند به همچنین بدون نشان دادن علائمی از خود به مرحله سنگینی از عفونت روده برسد.

CDAD به آسانی انتقال پذیر و واگیردار است.